

RENDICONTI DELLA R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Estratto dal vol. XXVI, serie 6^a, 2^o sem., fasc. 11. - Roma, dicembre 1937-XVI

Una specie asiatica di "Anopheles"
rinvenuta in Etiopia
(“ A. dthali Patton ”, 1905)

NOTA

DI

A. CORRADETTI



Nota

B

57

36

ROMA

DOTT. GIOVANNI BARDI

TIPOGrafo DELLA R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

1937-XVI

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

TELEGRAPH (202) 733-6000

TELEFAX (202) 733-6000

TELEVISION (202) 733-6000

INTERNET (202) 733-6000

WORLDWIDE (202) 733-6000

TELEPHONE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

TELEGRAPH (202) 733-6000

TELEFAX (202) 733-6000

TELEVISION (202) 733-6000

INTERNET (202) 733-6000

WORLDWIDE (202) 733-6000

TELEPHONE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

TELEGRAPH (202) 733-6000

TELEFAX (202) 733-6000

TELEVISION (202) 733-6000

INTERNET (202) 733-6000

WORLDWIDE (202) 733-6000

Parassitologia. -- *Una specie asiatica di «Anopheles» rinvenuta in Etiopia* («*A. dthali* PATTON», 1905). Nota preventiva di A. CORRADETTI, presentata ⁽¹⁾ dal Socio S. BAGLIONI.

Durante i mesi di aprile e maggio 1937 ho trovato nella regione del Semien, a circa 1300 metri di altezza, numerose larve di un *Anopheles* che non risulta ancora descritto per l'Africa tropicale, ma che era stato segnalato in India, Mesopotamia, Arabia, Palestina, Sinai, Belucistan e Waziristan.

La specie anofelica in questione è l'*A. dthali* PATTON, 1905, specie molto affine all'*A. rhodesiensis* THEOBALD, 1901, con il quale per molti anni è andato confuso. Fu soltanto nel 1931 che CHRISTOPHERS e PURI studiando l'*A. rhodesiensis* di Sierra Leone e confrontandolo con il supposto *A. rhodesiensis* presente in India si accorsero che quest'ultimo era notevolmente diverso e che corrispondeva invece alla descrizione dell'*A. dthali* data da PATTON nel 1905.

Secondo CHRISTOPHERS e PURI il territorio di distribuzione dell'*A. dthali* è esclusivamente mediterraneo-orientale, mentre quello dell'*A. rhodesiensis* è tipicamente etiopico. Il rinvenimento dell'*A. dthali* in una regione dello interno dell'Abissinia fa senz'altro modificare questa concezione, e quindi l'*A. dthali* deve entrare nel novero delle specie etiopiche.

Una descrizione morfologica della specie rinvenuta (larve e adulti), insieme con notizie sulla sua ecologia e sul suo *habitat*, comparirà in un prossimo numero della « Rivista di Parassitologia ».

Esemplari di adulti maschi e femmine e di larve di *A. dthali* sono depositati nella Sezione di Malariologia dell'Istituto di Sanità Pubblica in Roma.

(1) Nella seduta del 5 dicembre 1937.



~~328173~~



